

WORTELREST VERWIJDEREN

U heeft een afspraak bij KaakmeesterZ voor het verwijderen van een wortelrest. In deze folder leest u informatie over de behandeling.

DE BEHANDELING

Rondom de plaats waar de wortelrest zich bevindt, wordt uw mond verdoofd. Hierdoor is de behandeling pijnloos.

NA DE BEHANDELING

Na de behandeling kunt u last krijgen van napijn, een dikke wang of verhoging. Ook kunt u uw mond wat minder makkelijk openen en is slikken moeilijker. Over deze klachten hoeft u zich geen zorgen te maken; ze kunnen de eerste twee dagen toenemen maar verdwijnen daarna geleidelijk.

De wond

De gaastampons in uw mond kunt u na een half uur uitspugen. Om swelling van uw wang te voorkomen kunt u een ijszak (coldpack) op de wang te leggen. De hechtingen in de wond lossen na ongeveer 2 weken vanzelf op.

Pijn

U krijgt van ons een recept voor pijnstillers of andere medicatie. Deze gebruikt u volgens voorschrift.

Eten, drinken en roken

Na de behandeling mag u wat drinken, maar zorg ervoor dat u de mond niet spoelt. De eerste dagen gaat eten waarschijnlijk niet makkelijk.

Zachte voeding is vaak het prettigst. Na een paar dagen kunt u geleidelijk weer gewoon eten. Alcohol kunt u de eerste dagen beter niet gebruiken omdat dit de kans op een nabloeding vergroot. Ook roken raden we af: roken verstoort de wondgenezing waardoor u langer last van napijn zult hebben.

Mondverzorging

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond niet spoelen. Reinig uw mond met een normale tandenborstel. Na de eerste dag kunt u daarnaast gedurende vijf dagen uw mond spoelen met chloorhexidine 0,12% (Perio-Aid). Gebruikt u bloedverdunners? Dan schrijft uw behandelaar een spoelmiddel voor dat u juist wél vanaf de dag van de behandeling moet gebruiken. Dit middel voorkomt een nabloeding.

Verdoofd gevoel

Het kan soms gebeuren dat het verdoofde gevoel aanhoudt in de kin en onderlip aan de kant waar de wortelrest is verwijderd. Gelukkig komt het gevoel meestal vanzelf terug, maar dit kan enkele weken tot maanden duren. Hinderlijker is het als het gevoel in de halve tong uitvalt. Ook dit herstelt zich meestal spontaan en gelukkig is deze complicatie zeldzaam.

Verbinding tussen neusbijholte

Bij het verwijderen van een wortelrest uit de bovenkaak kan er een opening (gaatje) in de kaakholte ontstaan. Deze opening moet worden gesloten om ontsteking van de kaakholte te voorkomen.

Vertraagde wondgenezing

Een vertraagde wondgenezing wordt veroorzaakt door slechte doorbloeding. Zo'n vertraagde wondgenezing herkent u pijn in een schone, droge wond. Het helpt om de wond goed te spoelen met een zoutoplossing (één theelepel keukenzout oplossen in een kopje lauwwarm water). Daarnaast kunt u gedurende twee tot drie weken pijnstillers gebruiken. Bij pijn moet de wond gespoeld worden door uw behandelaar.

WANNEER MOET IK BELLEN?

Koorts

Krijgt u de eerste dagen na de behandeling koorts (hoger dan 38,5oC)? Neem dan contact op met de kliniek.

Nabloeding

Een wondje in de mond geeft altijd een spoortje bloed. Opgelost in speeksel lijkt dit al gauw veel. Bij een nabloeding is er meer bloed dan speeksel in de mond. Bijt in dit geval gedurende 30 minuten krachtig op een gaasje. Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de kliniek.

Toename pijn

Twee tot vier dagen na de behandeling kan de pijn bij de wond opeens heviger worden.

Deze pijn gaat gepaard met een vieze smaak en een vieze geur. Is dit het geval? Neem dan contact op met de kliniek.

VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer kom ik in aanmerking voor de behandeling?

U komt in aanmerking voor deze behandeling wanneer een van uw tanden of kiezen is afgebroken en in uw kaakbot een stuk van de wortel is achtergebleven (wortelrest). Ook kan een wortelrest blijven zitten na een poging tot verwijderen van een tand of kies. U heeft voor deze behandeling een verwijzing van uw tandarts nodig.

Doet de behandeling pijn?

De behandeling zelf doet geen pijn. De plaats waar de wortelrest verwijderd wordt, wordt immers verdoofd. Na de behandeling kunt u wel pijn krijgen. Hiervoor neemt u pijnmedicatie.

Mag ik na de behandeling zelf naar huis rijden?

U mag in principe alleen naar huis rijden. Heeft u ervaring met het "niet lekker voelen" na verdoving bij de tandarts, dan is het verstandig iemand mee te nemen voor vervoer.

Moet ik de kosten zelf betalen?

Soms wel en soms niet. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. Wel moet u het eigen risico betalen. Neem vóór de behandeling contact op met uw zorgverzekeraar. Dan weet u waar u aan toe bent.

VRAGEN EN CONTACT

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan contact op met KaakmeesterZ.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur op

085 77 300 50

In spoedgevallen in de avond of in het
weekend kunt u ons bereiken op

085 77 300 50

***KaakmeesterZ is de onbetwiste uitblinker
in de mondzorg! Als expertisecentrum biedt
KaakmeesterZ efficiënte, effectieve en
patiëntvriendelijke zorg. Dat doen we met
deskundige specialisten en de meest
moderne diagnostiek.***